



**COMPOSICIÓN.** Por comprimido: Citrato potásico 1080 mg (10 miliequivalentes), de los que corresponden 390 mg al potasio. Excipientes: Cera carnauba y Estearato magnésico. **FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE.** Citrato potásico en comprimido de matriz cérea (Wax Matrix)<sup>®</sup> de liberación sostenida. Frasco con 100 comprimidos. **ACTIVIDAD.** Reduce la cristalización del oxalato cálcico y la precipitación del ácido úrico. Proporciona además un aumento del pH urinario tendiendo a la normalidad y sin repercusiones sistémicas. **TITULAR Y FABRICANTE.** TITULAR: LABORATORIOS ROBERT, S. A. Dir. Técnico: J. Soler. Gran Vía Carlos III, 98, 08028 - BARCELONA (España). FABRICANTE : FERRER INTERNACIONAL, S.A. Dir. Técnico: Dr. F. Taxonera Buscallá, 1-9. 08190-Sant Cugat del Vallés (Barcelona). **INDICACIONES.** Para la prevención y tratamiento de la litiasis renal (por oxalato y/o fosfatos, de ácido úrico solo o acompañado de litiasis cálcica e hipocitratúrica). **CONTRAINDICACIONES.** Insuficiencia renal. Infecciones urinarias persistentes alcalinas. Obstrucción del tracto urinario. Hiperpotasemia. Insuficiencia adrenal. Alcalosis respiratoria o metabólica. Úlcera péptica activa. Obstrucción intestinal. Pacientes sometidos a terapia anticolinérgica. Pacientes con vaciado gástrico lento. **PRECAUCIONES.** Los comprimidos deben tragarse enteros; no pueden ser masticados, desleídos, partidos, etc e ingerirse unos 30 minutos después de las comidas para prevenir la aparición de trastornos gastrointestinales leves. La matriz cérea en que está contenida la sustancia activa, puede eliminarse vacía, por las heces, en forma aún visible. Véanse además, apartados de Advertencias e Interacciones medicamentosas. **INTERACCIONES.** No debe administrarse conjuntamente con diuréticos ahorradores de potasio como son Triamterene, Espironolactona o Amiloride. **ADVERTENCIAS.** Se recomienda seguir un régimen sin sal y que se aumente sustancialmente el consumo diario de líquidos. Uso en el embarazo y lactancia.- El médico vigilará muy estrictamente la administración de Acalka en estos pacientes. Uso en pacientes con insuficiencia: hepática, renal o de excreción de potasio.- Puede producirse hiperpotasemia. Uso en situaciones potencialmente peligrosas.- No está descrito ningún efecto desfavorable. **POSOLOGIA.** Pacientes con hipocitratúria leve o moderada: 3 comprimidos (30 mEq) al día, tragados, una 1/2 hora después de las 3 comidas principales. Con hipocitratúria severa: 6 comprimidos (60 mEq) al día, tragando 2 comprimidos aproximadamente media hora después de cada una de las 3 principales comidas. No es conveniente ni en casos muy severos sobrepasar la dosis de 10 comprimidos (100 mEq) al día. **SOBREDOSIS.** En caso de producirse hiperpotasemia administrar solución IV de dextrosa al 10% con 10 - 12 U de insulina/1000 ml. Si coexistiera acidosis: bicarbonato sódico IV y hemodiálisis o diálisis peritoneal. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. **REACCIONES ADVERSAS.** Pueden presentarse trastornos gastrointestinales leves que se atenúan mediante la administración conjunta de alimentos. **CADUCIDAD.** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA DEL FRASCO. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MATENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.** Texto revisado: Julio 1995.