

**Estudio para valorar
la calidad de vida e intensidad del dolor,
en pacientes con dolor oncológico moderado-severo,
atendidos en servicios de oncología radioterápica**

**Dr. Jorge Contreras Martínez
Oncología Radioterápica
H. Regional Carlos Haya
Málaga**

Dr. Zugazabeitia, Dra. López, Dra. Quintana, Dr. Nieto, Dr. Lazo, Dr. Poza
de Celis, Dr. Alvarado, Dra. Pérez y Dr. Provencio Pulla,
en nombre de los 124 investigadores del estudio C2

Estudio observacional, prospectivo, 3 meses de seguimiento

**Sub-análisis de los pacientes atendidos
en oncología radioterápica**

**Evolución del dolor, calidad de vida
y función intestinal**

Pacientes oncológicos, 1ª consulta por dolor
moderado-severo ($NRS_{0-10} \geq 4$)

752 pacientes de un total de 2.643
pacientes evaluables




Descripción de los pacientes

Varones 66%
Edad 63 ± 11


ECOG 0-1 73%

Tiempo desde el diagnóstico
 (meses) 15 ± 27

Localización tumor primario




Metástasis: 56%




QT 61,7%
 Paliativo 48,1%
 Curativo 52,1%
1ª Línea de tto. 68,5%

RT 92,7%
 Paliativo 52,1%
 Curativo 48,1%

Dolor secundario a




Intensidad del dolor




Calidad de vida de los pacientes


Pacientes CON problemas




Dolor de mal pronóstico 99%



Dolor secundario a



Intensidad del dolor




Pacientes mayoritariamente con dolor moderado, de origen metastásico, y con mal pronóstico de respuesta al tto.


ENV₀₋₁₀)

Calidad de vida de los pacientes


Pacientes CON problemas



Dolor de mal pronóstico 99%



Evolución de los pacientes




Temómetro: 0: el peor - 100 el mejor estado de salud imaginable

Índice: 0: Muerte - 1 salud perfecta



Evolución de los pacientes




Temómetro: 0: el peor - 100 el mejor estado de salud imaginable
 Índice: 0: Muerte - 1: salud perfecta

Mejoría significativa de la calidad de vida de los pacientes



Evolución de los pacientes


Calidad de vida





Temómetro: 0: el peor - 100 el mejor estado de salud imaginable
 Índice: 0: Muerte - 1: salud perfecta

Mejoría significativa de la calidad de vida de los pacientes

Alivio del dolor



Evolución de los pacientes





Temómetro: 0: el peor - 100 el mejor estado de salud imaginable
Índice: 0: Muerte - 1: salud perfecta

Mejoría significativa de la calidad de vida de los pacientes

Los pacientes constataron reducciones en la intensidad del dolor superiores al 50%, en todas las determinaciones



Evolución de los pacientes



Temómetro: 0: el peor - 100 el mejor estado de salud imaginable
 Índice: 0: Muerte - 1: salud perfecta

Mejoría significativa de la calidad de vida de los pacientes

Los pacientes constataron reducciones en la intensidad del dolor superiores al 50%, en todas las determinaciones

El 69% de los pacientes obtuvieron una mejoría en su calidad de vida $\geq 30\%$, en los tres meses de duración del estudio (índice EQ-5D)

Análisis de subpoblaciones

Oxicodona/Naloxona

- OXN sin otro opioide
- mantenido VB-M3

n = 111

Otros opioides

- Opioides ≠ OXN
- mantenido VB-M3

n = 47



Análisis de subpoblaciones

Oxicodona/Naloxona

- OXN sin otro opioide
- mantenido VB-M3

n = 111


Otros opioides

- Opioides ≠ OXN
- mantenido VB-M3

n = 47

Evolución de los pacientes

Alivio del dolor



Análisis de subpoblaciones

Oxicodona/Naloxona

- OXN sin otro opioide
- mantenido VB-M3

n = 111


Otros opioides

- Opioides ≠ OXN
- mantenido VB-M3


n = 47

Evolución de los pacientes

Alivio del dolor




Normalización de la función intestinal




Evolución de los pacientes

Impacto del dolor en la calidad de vida





Evolución de los pacientes

Impacto del dolor en la calidad de vida



Mejoría de la calidad de vida



Conclusiones

El tratamiento con opioides del dolor en los pacientes atendidos en consultas de Oncología Radioterápica se traduce en una rápida y significativa mejoría de la intensidad del mismo

La analgesia basada en opioides consigue una reducción significativa del impacto del dolor en la calidad de vida de los pacientes.

Cuando se comparan los resultados de los pacientes tratados con OXN vs otros opioides \neq OXN se constatan mejorías significativas en la intensidad del dolor, la calidad de vida y la función intestinal, a favor de OXN

Muchas gracias

